Humanbiologie 1

Wintersemester 2012/13

Achtung:

Hierbei handelt es sich um kein offizielles Dokument der FH- Burgenland. Für den Inhalt wird keine Haftung übernommen. Der Autor garantiert nicht für Fehlerfreiheit, Vollständigkeit und Genauigkeit der Informationen.

Vorlesung

A.Univ.Prof.Dr.Wolfgang Markt

Zusammenfassung

Martina Meister

Nervensystem

Informationsverarbeitung in lebenden Systemen:

- **Humorales (endokrines) System:** älter, chemische Basis (Botenstoffe) = Hormone, geringe Komplexität (können nicht so viel), höherer Zeitbedarf
- **Nervales System:** jünger, elektrische & chemische Basis, höhere Komplexität, geringerer Zeitbedarf
- **Autokrin – parakrine Mechanismen:** Zelle informiert Zelle
- **Zentrales Nervensystem:** Gehirn & Rückenmark (somatisch = willkürlich + vegetativ = unwillkürlich)
- **Peripheres Nervensystem:** alles außer ZNS (somatisch + vegetativ)

Anatomie und Physiologie des Nervensystems

- **Funktionelle Einheit des NS = Nervenzelle (= Neuron)**
- **Zellen:** an Zellmembran elektrischen Ladungsunterschied (wegen unterschiedlicher Verteilung von Ionen an der Innen und Außenseite der Zellmembran) = Ruhemembranpotential
- **Ladungsunterschied ab- und aufbauen:** Aktionspotential (AP) werden schnell über Nerven weitergeleitet, Infos werden in elektronischer Form weitergeleitet

Aufnahme und Codierung von Infos

- **Reiz:** mechanische, thermische, chemische Energie
- **Transduktion:** Nervenzelle verfügt über Rezeptoren/Sensoren die Reiz aufnehmen und in elektrische Signale umwandelt + Verstärkung
- **Transformation:** Rezeptorpotentiale langsam+ Energieverlust daher Transformation in AP
- **Aktionspotentiale:** Frequenz der Aktionspotentiale (Amplitude des Rezeptorpotentials wird in Frequenz der Aktionspotentiale umgewandelt = Frequenzcodierung der Reizstärke) starker Reiz = viel AP, schwacher Reiz = wenig AP

Peripheres Nervensystem: Reiz – Transduktion - Generator Strom - Transformation –Aktionspotentiale – Kodierung – Frequenz der AP

Weiterleitung

Zentrales Nervensystem: Präsynaptische Vorgänge – Dekodierung (im Gehirn) – postsynaptische Signal – Reaktionssysteme - Reaktion

Informationsverarbeitung im ZNS, Physiologie der Synapsen

- Umwandlung spezifischer Reize in AP: vorübergehend geht Spezifität der Info verloren, Fortleitung des einzelnen AP ist auf jeweils ein Neuron beschränkt, kein Übertritt eines AP zwischen Neuronen
- Synapsen = Schaltstellen: elektrisches Signal des AP wird in chemisches Signal umgewandelt = Freisetzung des Transmitters
- Transmitter: bindet sich an Rezeptormoleküle an der postsynaptischen Membran – Folge: neues elektrisches Signal wird generiert (postsynaptisches Potential)
- Postsynaptisches Potential: kann Neuentstehung von APs im postsynaptischen Neuron fördern (erregendes postsynaptisches Potential ESP) oder unterdrücken (inhibitorisches postsynaptisches Potential IPSP) => Selektion bei der Weiterleitung von Infos
- Komplexität der Informationsverarbeitung: unterschiedliche Transmitter, Komplexität der synaptischen Verschaltungen in neuronalen Netzwerken

Reflex

- Reaktion, zweckmäßige Antwort auf Reizung von Rezeptoren (Stammesgeschichtlich, individuellen Entwicklung) zB.: Halte und Stellreflexe(zB.: Stehen), Schutzreflexe, Fluchtreflexe, Lokomotionsreflexe (Augen), Nutritionsreflexe (Saugen)
- Unterschied: angeborene Reflexe = nicht konditionierten, und erworbenen Reflexen = konditionierten
- Reflexe können auch verändert und angepasst werden

Reflexbogen

Rezeptor (Reizaufnahme + Signaltransduktion) – fortgeleitete APs (transformierte Signale) – afferenter Nerv – ZNS – efferenter Nerv – fortgeleitete APs – Erfolgsorgan (sicht- oder messbare Reaktion)

Hormone

- **First Messenger:** Informationsvermittler: endokrinen Drüsen freigesetzt, wirken an Zellen von Erfolgsorganen spezifisch
- **Second Messenger:** Nachdem Hormone an Rezeptoren der Zielzelle gebunden haben, wird Information durch intrazelluläre Botenstoffe weitergeleitet, Hormone wirken über Hormonrezeptoren

Informationsvermittlung

- **Autokrin:** Hormon wirkt auf gleiche Zelle wo es produziert wurde
- **Parakrin:** Hormon wirkt auf benachbarte Zelle – Botenstoffe
- **Endokrin:** Hormon gelangt über Blutkreislauf in die Peripherie und wirkt dort an Zielzelle

Hormonwirkung/Hormonrezeptoren

- Hormone treten in geringer Konzentration auf!
- Jede Zelle kann Botenstoffe bilden/ausscheiden – werden in Zellmembran eingebunden
- Aufgaben: Wachstum, Steuerung von Reproduktionsvorgängen, Empfinden
- **Hormone = chemischer Botenstoff/Signalstoff**
- Gibt wasserlösliche & fettlösliche Hormone
- **Hormonrezeptoren:** hochspezifisch das richtige Hormon erkennen + hohe Bindungsaffinität, Hormonkonzentration ist gering
- **Spezifität durch Hormonrezeptor** = wirkt nur in der Zielzelle (gibt viel mehr Rezeptoren als Hormone)
- Up-/Down- Regulation: Zelle bestimmt über Anzahl der Hormonrezeptoren wieviel sie haben will
- Bindung des Hormons ist reversibel und nicht- kovalent, dh. wirkt so lang es gebunden ist
- Bindung des Hormons löst eine Konformationsänderung des Rezeptors aus (= chemische Verbindung)
- Nach Bindung leiten die Rezeptoren die Info an die Zelle weiter, wobei komplexe intrazelluläre Signaltransduktionskaskaden ausgelöst werden: Proteinphosphorylierung, Enzymktivierungen (Postrezeptor Effekte)

Hormonrezeptoren lassen sich in membransozierte und intrazelluläre Rezeptoren unterteilen

- **Membranassozierte Hormonrezeptoren:** Polypeptide und Katecholamine (polare Hormone) binden an Rezeptoren, die mit der Zellmembran assoziiert sind
- **Intrazelluläre Hormonrezeptoren:** Steroid und Schilddrüsenhormone (lipophile Hormone) binden an Rezeptoren die intrazellulär lokalisiert sind

Muskelphysiologie

- Nerven & Muskeln: Erregbare Strukturen, befähigt Aktionspotentiale zu bilden und weiterzuleiten
- Aktionspotential im Muskel = Kontraktion
- **Skellettmuskel:** quergestreift, Kontraktion wird nerval ausgelöst, willkürlich, Dauerkontraktion möglich (= tetanisch), keine syncytiale Verbindung zwischen den Muskelfasern, dehn- verkürzbar, für Körperhaltung + Bewegung + Blutrückfluss
- **Herzmuskel:** quergestreift, Schrittmacher (hat von sich aus AP), unwillkürlich, Kontraktion nicht tetanisch (Systole, Diastole), syncytiale Verbindung zwischen Muskelfasern (anatomisch + funktionell verbunden)
- **Glatter Muskel:** glatt, nerval und Schrittmacher, unwillkürlich, Kontraktion: tetanisch (Dauerkontraktion), zB.: Blutgefäße, Koliken, syncytiale Verbindungen zwischen Muskelfasern

Muskelenergetik

- Arbeitender Muskel hat hohen Energiebedarf
- Mäßige Arbeit im Ausdauer- Leistungsbereich Fett verbraucht, zunehmende Intensität: Glukose
- **Plötzliche hochintensive Belastung:** Energie: ATP Speicher, Zerfall von Kreatinphosphat (kurzfristig 40-50s), danach aerobe Energiiprozesse (Oxidation von Kohlenhydraten und Fetten)
- Schnellkraftbelastung (bis 45 sec): rein anerob, energiereiche Phosphate (ATP, Kreatinphosphat)
- Kurzzeitausdauer (45s- 2m): vorwiegend anaerob, Kohlenhydrate (Glykolyse)
- Mittelzeitausdauer (2m - 8m): aerob/anaerob, Kohlenhydrate
- Langzeitausdauer (8m – 60m): vorwiegend aerob, gemischte Kohlenhydrate/Fette
- Extreme Ausdauerbelastung (über 1h): rein aerob, gemischte Kohlenhydrate/Fette

Energieäquivalent: Bezeichnung für das im Zuge des Energiestoffwechsels gebildete ATP (universell für energiebedürftige Prozesse verwendbar)

- **ADP = Adenosindiphosphat,** 2 Phosphatreste bleiben bei der Hydrolyse von ATP über
- **ATP = Adenosintriophosphat:** 3 Phosphate (am energiereichsten), 3 Phosphate
- **Kreatinphosphat + ADP -> Kreatin + ATP** (können nur ATP nutzen nicht Kreatinphosphat), anaerob(ohne O₂ Verwendung), alaktazid (ohne Milchsäureentstehung)
- **Glukose + ADP -> Milchsäure + ATP (Glykolyse),** zeitlich begrenzt – Übersäuerung, anaerob (ohne O₂ Verwendung), laktazid (mit Milchsäureentstehung)
- **Glukose + O₂ + ADP -> Wasser + Kohlensäure + ATP:** aerob (mit O₂ Verwendung), alaktazid
- **Fette + O₂ + ADP -> Wasser + Kohlensäure + ATP:** aerob, alaktazid (Langzeitenergie)
- **Arminosäuren (Proteine):** gleich in Muskel, aerob, alaktazid
- Aerob: Langsam, Energiebereitstellung unter Verwendung von Sauerstoff
- Anaerob: Schnell, Energiebereitstellung ohne Verwendung von Sauerstoff

Thermoregulation

- Mensch = homoiothermes Lebewesen -> Körperkerntemperatur muss um 37°C konstant sein

Wärmetransport: Konvektion & Leitung, Strahlung, Verdunstung

- **Konvektion & Leitung:** Wärmeaustausch zwischen zwei in Kontakt stehenden ruhenden (Leitungen) oder bewegten (Konvektion) Objekten, im Organismus: konvektiver Wärmetransport mit Blut, Veränderung der Blutgefäßweite vor allem in der Haut
- **Strahlung:** Wärmetransport durch Infrarotwellen, kein Kontakt, Wärmetransport abhängig von Temperaturdifferenz und Oberflächenbeschaffenheit
- **Verdunstung:** Wärmeabgabe durch Verdunsten von Schweiß auf der Haut (wichtig ist wie gut er verdunsten kann, nicht wie viel) Luftfeuchtigkeit große Rolle, einzige Möglichkeit der Wärmeabgaben wenn durch Konvektion & Strahlung Wärme zugeführt wird

Empfinden beeinflusst durch

- Lufttemperatur, Strahlungstemperatur & Strahlungsbedingungen, Windgeschwindigkeit & Luftbewegung, Wasserdampfdruck in der Luft, endogenen Wärmeproduktion, Kleidung, körperlichen Aktivität
- Angenehm bei Körperruhe und normaler Bekleidung: 23°C, 0,1 m/s Wind, Feuchte 50%

Regulation/Thermorezeptoren

- **Hypothalamus:** Wärmeregulationszentrum, Infos von Thermorezeptoren an verschiedenen Stellen, Ist- Wert wird mit Soll-Wert (37°C) verglichen, Kälteabwehrmaßnahmen oder Wärmeabwehrmaßnahmen
- **Wärmerezeptoren:** gleichmäßig verteilt
- **Kälterezeptoren:** 10x so viel, charakteristisches Verteilungsmuster, Körperstellen unterschiedlich starke Reaktion

Neutraltemperatur/Indifferenzzone

- **Neutraltemperatur:** Hauttemperatur 32-34°C, keine thermische Empfindungen, ab 45°C, unter 18°C Schmerzempfinden
- **Indifferenzzone:** Umgebungstemperatur die weder kalt noch warm ist, ist von verschiedenen Faktoren abhängig, zB. Wärmeleiteigenschaft

Störungen

- **Hypothermie:** Körperkerntemperatur unter 35°C, immer von außen induziert, ab 28°C lebensbedrohlich
- **Hyperthermie:** Körperkerntemperatur über 37°C, Körperliche Arbeit, Krankheit, von außen (zB.: Sauna)

Abwehrmechanismen

- **Kälteabwehr:** Vasokonstriktion (Gefäßverengung), zitterfreie Wärmebildung (Hormone), Kältezittern, gesteigerte Aktivität, Verhaltensanpassung
- **Wärmeabwehr:** Vasodilatation (Gefäßerweiterung), Schweißsekretion (Verdunstung), Verhaltensanpassung

Herz- Kreislaufsystem

Transportsystem von

- Atemgasen, Nährstoffen und Metaboliten für den Zellstoffwechsel
- Wasser und Elektrolyten für den Wasser- und Mineralhaushalt
- Säuren und Basen für die pH-Regulation
- Wärme zur Körperoberfläche für die Temperaturregulation
- Hormonale Informationsträger
- Zellulären und humoralen Abwehrsystemen

Komponenten des Herz- Kreislaufsystems

- **Herz:** Hohlorgan, saugt Blut aus venösen Blutgefäßen an und presst in arterielle Gefäße hinaus, vier Abschnitte: rechter und linker Vorhof und rechte und linke Kammer
- **Hochdrucksystem:** Arterien des Körperkreislaufs, kennzeichnend: hoher Druck (Blutdruck) und das Pulsphänomen, haben eine Druckspeicherfunktion
- **Mikrozirkulationssystem:** Kapillaren und Lymphgefäße, Flüssigkeits- und Stoffaustausch zwischen Blut und Zellen
- **Niederdrucksystem:** Venen des Körperkreislaufs und Lungenkreislaufs, kennzeichnend: niedrige Druckwerte und hoher Volumsanteil, hat eine Volumsspeicherfunktion

Physiologie des Herzens

Saug-Druckpumpe mit „Elektroantrieb“, man spricht von einer Elektrophysiologie des Herzens und einer Herzmechanik, Daueraktiver Muskel

Elektrophysiologie des Herzens

- Muskuläres Hohlorgan, befähigt Aktionspotentiale zu bilden und weiterzuleiten
- **Reizbildungs- und Reizleitungssysteme** (Elektroantrieb) und **Arbeitsmyocard** (Grundlage der Saug- und Druckwirkung)
- Bildung und Ausbreitung der elektrischen Erregung im Herz ist autonom, aber vegetatives Nervensystem beeinflusst **Frequenz der Erregungsbildung (Chronotropie)** und **Geschwindigkeit der Erregungsausbreitung (Dromotropie)**
- **Parasympathikus(Vagus):** Grundaktivität (merkt man vor allem nachts), negativ chronotrop (senkt Herzfrequenz), negativ dromotrop (Erregungsleitung verlangsamt)
- **Sympathicus:** kommt bei Aktivität dazu (Tag), positiv chronotrop (erhöht Herzfrequenz), positiv dromotrop (Erregungsleitung beschleunigt) – Blut fließt schneller
- **Arbeitsmyocard:** quergestreifte Arbeitsmuskulatur, Erregungsleitungssystem fortgeleiteter Aktionspotentiale greift auf Arbeitsmuskulatur über und bringt diese zur Kontraktion, ist nicht tetanisierbar und Kontraktionsstärke wird nicht durch Aktionspotentiale des Reizleitungssystem erhöht, Grund: lange Aktionspotentialdauer welche die Dauer der Kontraktion übertrifft, dh.: die auf ein Aktionspotential folgende Kontraktion der Herzmuskelfaser ist bereits wieder abgeklungen, bevor das nächste Aktionspotential eintrifft, Aktionspotential und Kontraktion der Herzmuskelfaser ist in seiner Amplitude (Ausschlag) und Zeitdauer festgelegt

Herzmechanik

- Bildung und Weiterleitung der Aktionspotentiale ist Voraussetzung für die Tätigkeit des Herzens
 - Herzarbeit wird von Saug- und Druckleistung des Herzens erbracht
 - Gegenstand der Herzmechanik: Druck und Volums Veränderung während der Herzaktion
 - **Ansaugphase (Diastole)** passiv 2/3 Zeit – **Austreibungsphase (Systole)** aktiv 1/3 Zeit
 - Diastole bestimmt Herzfrequenz ca. 220- Alter, Zyklus ca. 1 sec
 - **Vier Herzklappen:** Ventile – legen Richtung der Blutströmung fest, räumlich auf einer Ebene: Ventilebene
 - **Artrio- Ventrikuläre Klappen (AV- Klappen):** Segelklappen: Trikuspidalklappe , Mitralklappe: Zwischen Vorhöfen und Kammern
 - **Taschenklappen:** Pulmonalklappe, Aortenklappe: Zwischen Kammer und Ausstromgefäß
 - **Herzzyklus:** späte Diastole - Vorhof Systole – Isovolumetrische Ventrikel Kontraktion – Ventrikel Auswurf Phase – Isovolumetrische Ventrikel Erschlaffung
1. **Späte Diastole:** A-V Klappen offen, Taschenklappen zu, Blut strömt durch Druckunterschied von Vorhöfen in Kammern (70% der Ventrikelfüllung)
 2. **Vorhof Systole:** Durch Kontraktion der Vorhöfe restliche Füllung der Kammern (30%). Druck in Kammern höher als Vorhofdruck - AV Klappen schließen
 3. **Isovolumetrische Ventrikel- Kontraktion:** Rascher Druckanstieg in den Kammern, bis der Druck über dem Druck in den abführenden arteriellen Gefäßen angestiegen ist - Öffnung der Taschenklappen
 4. **Ventrikel- Auswurf- Phase:** Auxotone Kontraktion der Kammermuskulatur – kurzzeitiger weiterer Druckanstieg bis zum systolischen RR- Wert – Auswurf des Schlagvolumens. Durch Zusammenziehen der Herzmuskelfassern, Herabziehen der Ventilebene – Saugwirkung auf die herznahen Venen zur raschen Füllung der Vorhöfe
 5. **Isovolumetrische Ventrikel- Erschlaffung:** Rascher Druckabfall in den Ventrikeln – nach Unterschreiten des Blutdrucks, Schluss der Taschenklappen – nach Unterschreiten des Vorhofdrucks Öffnung der AV Klappen

Herzzeitvolumen

- Entscheidend für Pumpleistungsfähigkeit des Herzens
- Schlagvolumen x Frequenz
- HMV: ca. 5l HMV in Ruhe, kann bis ca. 20-25l gesteigert werden
- Herzminutenvolumen (HMV) kann gesteigert werden über
- **Steigerung der Herzfrequenz** (positiv chronotrope Wirkung des Sympathikus)
- **Steigerung des Schlagvolumens:** Erhöhung des Blutvolumens im Herzen oder Steigerung der Herzkraft durch den Sympathikus (positiv inotrope Wirkung des Sympathicus)

Herzenergetik

- Arbeit des Herzens: ca. 5% des täglichen Energiebedarfs - Herz erhält ca. 5% des Herzzeitvolumens
- Herz braucht in Ruhe sehr viel O₂ , wenn erhöhter O₂ Bedarf - erfolgt Durchblutungssteigerung
- **Reize für Durchblutungssteigerung:** O₂ Mangel im Myokard (Herzmuskel), Sympathicusimpulse
- **Nährstoffe für Energiegewinnung des Herzens in der Ruhe:** vor allem Fettsäuren und Glukose, bei Belastung immer mehr Milchsäure
- **Myokardischämie** (Unterversorgung mit O₂): 3-4 Minuten – Herz kann seine Funktion nicht mehr erfüllen, 5-6 Minuten – Herzstillstand

Hochdrucksystem (Arterien)

- Kennzeichnend: Hoher Druck, Phänomen des arteriellen Pulses
- **Periodische Druckschwankungen:** systolischer und diastolischer Blutdruck, abhängig vom Herzzeitvolumen, der Elastizität der Arterienwand und der Weite der Arterien
- **Systolischer Blutdruck:** abhängig vom Herzzeitvolumen
- **Diastolischer Blutdruck:** abhängig vom peripheren arteriellen Widerstand, durch Weite der Arteriolen repräsentiert
- **Aufgaben:** für eine situationsangepasste Organ und Gewebepерfusion (Durchblutung) zu sorgen
- Maß dafür ist der mittlere Blutdruck: Druckpulskurve oder einfache Faustregel
- **Mittlerer Blutdruck (= Perfusionsdruck)** = diast. RR + 1/3 RR Amplitude (RR- Amplitude = systol. RR – diast. RR)
- **Arterieller Blutdruck** ist keine statische sondern eine dynamische Größe – Blutdruckvariabilität
- **Beeinflussende Faktoren:** genetische Faktoren, Rhythmen, psychische Faktoren, Nahrungsaufnahme, körperliche Arbeit, Körperlage, Lebensalter, Reize wie Stress Geräusche Außentemperatur

Mikrozirkulationssystem (Kapillaren und Lymphgefäße)

- **Versorgung und Entsorgung der Organe und des Gewebes,** durch Austausch von Flüssigkeit, Elektrolyten, Nährstoffen, Atemgasen
- Wichtige Funktion bei Flüssigkeitsaustausch durch Filtration: **Blutdruck in den Kapillaren** – drückt Flüssigkeit in das Gewebe, **Plasmaeiweißkörper** – hält Flüssigkeit in den Kapillaren zurück
- Auf der arteriellen Seite der Kapillare wird mehr Flüssigkeit filtriert als auf der venösen Seite resorbiert wird, restliche Flüssigkeit wird durch die Lymphe abtransportiert (Drainagefunktion der Lymphe)
- **Ödem:** Flüssigkeitsansammlung im Gewebe, verursacht durch: venösen Rückstau, Eiweißmangel (-Verlust), Lymphstau

Niederdrucksystem (Venen des Körperkreislaufs und Lungenkreislaufs)

- **2 Funktionen: Blutspeicherung** (gesamtes Niederdrucksystem), **Rücktransport** des Blutes zum Herzen (Venen des Körperkreislaufs)
- **Gefäße des Niederdrucksystems = Kapazitätsgefäße** (gut dehnbar, Volumsveränderung bewirkt keine große Druckveränderung, da sie nicht prall gefüllt sind)
- Venen des Körperkreislaufs über 60%, im Niederdrucksystem über 80% des zirkulierenden Blutvolumens
- **Rücktransport zum Herzen:** Druckdifferenz zwischen peripheren und zentralen Venen, atmungsabhängige Druckschwankungen im Brust und Bauchraum, Muskelvenenpumpe (Extremitäten, Venenklappen), Herzrhythmickeit (Sogwirkung auf die herznahen großen Venen)

Kreislaufregulation

- **Adäquate Organ und Gewebepерfusion,** durch hohen stabilen systemischen Blutdruck und Möglichkeit die Durchblutung einzelner Organe und des Gewebes selektiv zu verändern
- Gibt eine **Blutdruckregulation** und eine **Durchblutungsregulation**
- **Stabiler Blutdruck:** Abstimmung des Blutvolumens im Blutgefäß und der Blutgefäßweite

- **Kurzfristig: Neural:** Rascher Wirkungseintritt, Blutdruckstabilisierung, Baro-(Presso-)rezeptorenreflex: Blutdruck im Aortenbogen und Carotissinus registriert (Druck auf Arterienwand)– Meldung an Kreislaufzentren im Gehirnstamm:
Blutdruck zu niedrig: HMV wird gesteigert durch Herzfrequenzerhöhung → systolischer Blutdruck steigt, Kontraktion (zusammenziehen) der Arteriolen → diastolischer Blutdruck steigt
Blutdruck zu hoch: HMV wird gesenkt durch Herzfrequenzsenkung → systolischer Blutdruck sinkt, Relaxation der Arteriolen → diastolischer Blutdruck sinkt
- **Mittelfristig: Hormonell:** Renin-Angiotensin-Aldosteron-Mechanismus, Minderdurchblutung der Niere: Freisetzung von Renin → Aktivierung von Angiotensin (wirkt gefäßverengend), → Blutdruck steigt durch starke Vasokonstriktion (Gefäßverengung), Freisetzung von Aldosteron aus der Nebennierenrinde → fördert in den Nierenkanälchen den Rücktransport von Natrium und Wasser aus dem Urin ins Blut → Kochsalzgehalt des Blutes und das Blutvolumen steigen
- **Langfristig: Hormonell:** Bei Absinken des Blutvolumens: ADH (Anti- Diuretisches- Hormon) → Freisetzung aus dem Hypophysenhinterlappen → Wasserretention der Niere (sichert Wasserbestand durch Verminderung der Harnausscheidung) → Blutvolumen und Blutdruck steigen, Hohe (unphysiologische) Mengen von ADH führen auch direkt zur Vasokonstriktion (Gefäßverengung)

Herz- Kreislauf und körperliche Belastung

- Herzleistung ist beim gesunden Menschen der limitierende Faktor für seine Höchstleistungsfähigkeit
- Anstieg des HMV wegen Zunahme der Muskeldurchblutung
- HMV durch Steigerung der Herzfrequenz
- Wechselbeziehung (Korrelation) zwischen Ausmaß der körperlichen Leistung und Herzfrequenz → Maß für individuelle Belastungsfähigkeit
- **Systolischer Blutdruck steigt bei Belastung** (da abhängig vom HMV)
- **Diastolischer Blutdruck verändert sich gegenüber den Ruhewerten nur wenig** (abhängig vom peripheren arteriellen Gefäßwiderstand – Teil der Arteriolen verengt sich zb. Magen/Darm – Teil der Arteriolen weitet sich zb. Muskulatur = > gegensätzliche Einflüsse heben sich auf)

Atmungsphysiologie

- Unterteilbar in: **Äußere Atmung**, **Innere Atmung** und **Atmungsregulation**
- Aufgaben: ständige und ausreichende Versorgung mit O₂, Abatmung von Co₂ (Säure- Basen Haushalt)
- Arteriell Blut (fast 100% O₂ Sättigung) Venöses Blut (75% O₂ Sättigung)
- 1 von 4 Sauerstoffmolekülen werden ans Gewebe abgegeben

Äußere Atmung

- Austausch der Atemgase Sauerstoff und Kohlendioxid zwischen Umgebungsluft und dem Blut
- Atemapparat: Thorax und Lunge
- Vorgänge: **Ventilation** (Be- und Entlüftung der Lunge) **Perfusion** (Durchblutung der Lunge) **Diffusion** (Austausch der Atemgase zwischen Lunge und Blut)

Ventilation (Be- bzw. Entlüftung der Lunge)

- Lunge und Thorax wirken gemeinsam (Bestreben in entgegengesetzte Richtungen zu wirken)
- **Lunge**: Infolge ihrer elastischen Fasern eine starke Tendenz sich zu verkleinern
- **Thorax**: Aufgrund der Anatomie eine leichte Tendenz sich nach außen zu erweitern
- Spalt zwischen Lunge und Thoraxinnenseite: **Intrapleuralspalt**: gefüllt mit **Pleuralflüssigkeit** die die Trennung dieser beiden Oberflächen verhindert -> Folge: im Intrapleuralspalt herrscht ein subatmosphärischer Druck
- **Tätigkeit des Atemapparates**: Für **Einatmung (Inspiration)** und **Ausatmung (Expiration)** ist ein **Druckunterschied** zwischen der Umgebungsluft und dem Lungeninneren notwendig
- Fördernde Luftvolumen folgt passiv dem Druckunterschied bis zum Druckausgleich
- **Inspiration**: Aktiver Vorgang: Muskelkraft notwendig: um den Druck in der Lunge (intrapulmonaler Druck) unter den Umgebungsdruck (Luftdruck, Atmosphärendruck) abzusenken müssen die Einatemmuskeln (Zwerchfell, äußere Zwischenrippenmuskel) den Thorax erweitern und die Lunge ausdehnen
- **Expiration**: Passiver Vorgang (Bei Ruheatmung): Druck in der Lunge übersteigt den Atmosphärendruck -> Luft wird aus der Lunge hinausgepresst, kein Muskeleinsatz erforderlich, da sich die Lunge nach Erschlaffung der Einatemmuskeln von selbst zusammenzieht
- **Ruheatmung**: Druckänderungen sind relativ gering, meist unbewusst, die Notwendigkeit größerer Druckveränderungen für die Förderung der Luftvolumina wird dem Menschen als unangenehmes Gefühl der Atemnot bewusst (z.B.: bei Elastizitätsverlust des Atemapparates oder Verengung der Luftwege)
- **Vegatives Nervensystem** steuert Weite der Bronchien
- **Symphaticus**: erweitert Bronchien
- **Parasympatikus**: verengt Bronchien (daher Atemprobleme vor allem Nachts)

Perfusion (Durchblutung der Lunge)

- **Lungenkreislauf gehört zum Niederdrucksystem**
- **Niedriger Druck** -> keine hohen Druckunterschiede (Lunge kleiner Kreislauf, Körper großer Kreislauf -> muss in der selben Zeit, gleich viel Blut gepumpt werden) -> Problem: wenn das HZV durch Anstrengung größer wird
- Durchblutung der Lungenbasis ist immer besser als der Lungenspitzen (Schwerkraft)

Diffusion (Übertritt der Atemgase von der Lunge in das Blut bzw. umgekehrt)

Gas Austausch zwischen Lunge und Blut hängt von folgenden Faktoren ab:

- **Gaskonzentration** in Lunge und Blut (Gaskonzentrationsdifferenz – wesentliche Bedeutung)
Gaskonzentrationsdifferenz von Sauerstoff ist höher als von Kohlendioxid
Tiefe der Atemzüge hat Einfluss auf die Atemgaskonzentration
Alveolen (Lungenbläschen): findet Gasaustausch statt (alveoläre Anteil: flach: 250ml- tief:350ml)
Todraumvolumen: kein Gasaustausch (Luftwege: ca. 150ml)
- **Ventilations- Perfusionsverhältnis**
Von großer praktischer Bedeutung, in aufrechter Lage unterliegen beide der Schwerkraft (Perfusion etwas stärker), Gasaustausch in den Lungenspitzen ist schlechter als in der Lungenbasis
- **Durchlässigkeit verschiedener Membranen für Atemgase**
Membrandurchlässigkeit für Kohlendioxid ist höher als für Sauerstoff (relativiert Gaskonzentrationsdifferenz) Gibt mehr Probleme beim Übertritt von Sauerstoff als beim Übertritt von Kohlendioxid
- **Kontaktzeit** (1s) und **Kontaktfläche** (80m² innere Lunge) – wenig praktische Bedeutung

Innere Atmung

- Transport der Atemgase im Blut
- Gasaustausch im Gewebe

Sauerstofftransport:

- **99% wird an Hämoglobin** (roter Blutfarbstoff) gebunden, **1% an Plasma**
- **Oxygenierung:** das sich im Hämoglobin befindliche zweiwertige Eisenion bindet Sauerstoff **reversibel**
- **Kohlenmonoxid Vergiftung:** Bindet sich Anstelle von Sauerstoff an das Hämoglobin
- **Sauerstoffbindungskurve** des Hämoglobin: Beziehung zwischen Sauerstoffkonzentration und Sauerstoffgehalt des Hämoglobins
Bei normalen Sauerstoffpartialdruck im Blut ist das Hämoglobin fast ganz mit Sauerstoff gesättigt
Bei niedrigen Sauerstoffkonzentrationen besteht auch schon einen hohe Sauerstoffsättigung
- Stärke der Sauerstoffbindung an das Hämoglobin kann verändert werden

Rechtsverschiebung der Sauerstoffbindungskurve: lockerere Sauerstoffbindung (Sauerstoffabgabe an das Gewebe wird verbessert)

- pCO₂ erhöht (Steigerung der Konzentration von Kohlendioxid – Blut das durch die Lunge fließt)
- Temperaturanstieg (Muskel/Bewegung)
- Absinken des PH- Wert (Anaerob)
- 2,3 Diphosphoglycerat steigt (Abbauprodukt der Glukose – Kennzeichen der Höhenakklimation)

Linksverschiebung der Sauerstoffbindungskurve: stärkere Sauerstoffbindung

- pCO₂ sinkt (Absinken der Konzentration von Kohlendioxid)
- Temperaturabnahme
- Anstieg des PH- Wertes (krankhaft)
- 2,3 Diphosphoglycerat sinkt (gibt es nur beim Embryo)

Transport von Kohlendioxid

- 80% von Kohlendioxid wird nach Diffusion in den **Erythrocyten in Hydrogencarbonat** umgewandelt
- Vorgang wird gefördert, dass die entstehenden H^+ Ionen vom Hämoglobin, das seinen Sauerstoff teilweise abgegeben hat (**desoxygeniertes Hämoglobin**) abgepuffert werden kann
- Das in den Erythrozyten gebildete **Hydrogencarbonat tritt zum Teil ins Plasma** über wo es als wichtige **Puffersubstanz im Säure Basenhaushalt** fungiert
- In der Lunge wird vom Hämoglobin Sauerstoff aufgenommen, dadurch werden die H^+ Ionen wieder frei, verbinden sich mit Hydrogencarbonat wodurch wieder Kohlendioxid entsteht, welches abgeatmet werden kann
- Durch die Bildung von Hydrogencarbonat und die Möglichkeit die **Abatmung von Kohlendioxid** zu variieren, greift die Atmung in die **Regulation des Säure Basenhaushaltes** ein

Atemregulation

- Hirnstamm befindliche Gebiete regulieren die Ruheatmung und die Anpassung der Atmung an Situationen
- **Ruheatmung** (regelmäßig, stereotyp): wird vor allem über Schrittmacherzellen aus der Medulla oblongata gesteuert
- **Atemanpassung** (vielfältig, variabel, willkürlich): Informationen und Beeinflussung spielen eine Rolle, Unterschied: rückgekoppelte und rückgekoppelte Atemantriebe (Regulationscharakter)
- Verbraucht man mehr O_2 bildet man mehr CO_2
- Atmung gibt den psychischen Zustand wieder

Rythmogenese der Atmung

- **Respiratorische Neuronen (RN) (in der Medulla oblongata) bekommen die Informationen**
- Chemischen Atmungsantrieb + Zentrale und reflektorische Einflüsse
- **Rückgekoppelte Atemantriebe:** Zentrale Antriebe, Chemorezeptoren, Dehnungsrezeptoren, Irritantrezeptoren
Chemorezeptoren: Periphere (Aortenbogen, Carotissimus = große Arterie die das Gehirn versorgt)
Zentrale (4 Ventrikel, Liquor = Hirnflüssigkeit -> größten Einfluss auf die Atmung, messbar durch Wasserstoffionenkonzentration)
- **Nicht rückgekoppelte Atemantriebe:** Höhere Zentren, Hormone, Körpertemperatur, Thermorezeptoren, Schmerzrezeptoren, Pressorezeptoren, Mechanorezeptoren

Energiehaushalt

- Körperfunktionen können nur stattfinden, wenn dafür vom Organismus ausreichend Energie in Form von ATP bildet und den Zellen zur Verfügung stellt
- Nährstoffe und Sauerstoff aus der Umwelt werden zu ATP gemacht und dann in der Zelle (Energieumwandler) verwendet und als Energie wieder an die Umwelt abgegeben

Energie:

- Chemische Energie: Fermentation (Gärung) Respiration (Atmung)
- Physikalische Energie: Photosynthese

Arbeit:

- Chemische Arbeit: Biosynthese (Verarbeitung von Nahrung)
- Mechanische Arbeit: Bewegung
- Osmotische Arbeit: Transport (Ausbildung und Aufrechterhaltung von Konzentrationsgradienten, energieabhängige Transportprozesse bei Resorption und Aufnahme von Stoffen in die Zelle, Erregungsbildung und Reizleitung)

Energie liefernder Nährstoff + O₂ = ATP + H₂O + CO₂

- Vorbereitende Reaktion: Aminosäuren(wird zusätzlich noch NH₃ gebildet), Glukose und Fettsäuren werden über verschiedene Stoffwechselwege vor allem zu Acetyl-CoA abgebaut
- Gemeinsame Endstrecke: Oxidation im Citratzyklus
- Biologische Oxidation: in der Atmungskette (Mitochondrien) wird Coenzym gebundener Wasserstoff zu H₂O oxidiert (ATP entsteht)
- **Energieäquivalent(in kJ/g):** Energiegehalt der Nährstoffe oder von Sauerstoff (Energieausbeute bei Einsatz von 1l O₂ bei der Oxidation der Nährstoffe), Menge des gebildeten ATP
- **Respiratorischer Quotient RQ:** Verhältnis zwischen CO₂ Abgabe und CO₂ Aufnahme => RQ=CO₂Abgabe/O₂Verbrauch
- Höhe des RQ: Hinweis auf Art der bevorzugten oxidierten Substrate

Energieumsatz:

- Grundumsatz (Schlafumsatz + Wachzustand): Sympathisches Nervensystem, Hormone, genetische Faktoren, Geschlecht, Alter, Fettmasse, fettfreie Masse
- Thermogene Wirkung der Nahrung: Menge/Zusammensetzung der Nahrung
- Spontane körperliche Aktivität: genetische Faktoren, sympathisches Nervensystem
- Willkürliche körperliche Aktivität: Intensität, Dauer, Körpergewicht
- Energieverbrauch: Leber 26%, Muskel 26%, Gehirn 18%, Herz 9%, Nieren 7%, Rest 14%

Wasserhaushalt

Flüssigkeitsräume: Gesamte Flüssigkeit (60% des Körpergewichts)

- **Intrazellulärer Flüssigkeitsraum** (40% des KG): enthält Kaliumsalze und Proteine
- **Extrazellulärer Flüssigkeitsraum** (20% des KG): Kochsalzlösung unterteilt in: Interstitieller Flüssigkeitsraum (15% des KG) und Plasma (5% des KG)
- **Flüssigkeitsaufnahme:** Nahrung (700ml), Trinken (1000-1500ml), Oxidationswasser (300ml)
- **Flüssigkeitsabgabe:** Stuhl (100ml), Urin (1000-1500ml), Lunge (400ml), Haut (500ml)
- Aufrechterhaltung des Wasser und Salzhaushaltes ist notwendig für die Funktion der Zellen
- Regulation durch Durst und Harnausscheidung

Hormonelle Systeme zur Regulation:

- **Antidiuretische Hormon (ADH):** Natriumretention -> Wasserretention
- **Renin Angiotensin Adosteron System:** verminderter Blutdruck, Natrium- und Wasserretention (Niere, Darm, Schweißdrüsen)
- **Natriuretische Hormone:** von der Muskulatur der Herzvorhöfe freigesetzt - regen zur Harnausscheidung an- vor allem Natrium

Regulationsziele des Flüssigkeitshaushaltes

- **Erhaltung der Osmolarität:** (wichtigstes Ziel): Chemische Teilchen haben einen Wassermantel (Zahl ist wichtig, nicht Art)
- **Volumenkonstanz:** Wasser wird aus Gewebe genommen um Osmolarität zu erhalten
- Informationen: Osmorezeptoren (Hypothalamus und Leber), Volumsrezeptoren (Niederdrucksystem)
- Reaktion des ADH: Anstieg der Plasmaosmolarität 1-2%, Abfall des Plasmavolumens 10-20%

Wassermangel (% des KG)

- 1-5%: Durst, Unbehagen, Einschränkung der Bewegung, Appetitlosigkeit, Hautröte, Ungeduld, Müdigkeit, Erhöhte Herzfrequenz, Erhöhte Rektaltemperatur, Übelkeit
- 6-10%: Schwindelgefühl, Kopfschmerzen, Atemnot, Kribbeln in den Gliedern, Vermindertes Blutvolumen, Erhöhte Blutkonzentration, Ausbleiben der Speichelbildung, Cyanose, Sprechschwierigkeiten, Gehunfähigkeit
- 11-20%: Delirium, Krämpfe, Geschwollene Zunge, Unfähigkeit zum Schlucken, Schwerhörigkeit, Verschleiertes Sehen, Runzelige Haut, Schmerzhaftes Harnlassen, Empfindungslose Haut, Anurie

Osmolarität

Anzahl osmotisch aktiver Teilchen in einem bestimmten Volumen unabhängig von der Art der Teilchen

- Hyperton = hyperosmolar: höhere Osmolarität als Vergleichslösung
- Isoton = isoosmolar: gleiche Osmolarität wie Vergleichslösung
- Hypoton = hypoosmolar: geringere Osmolarität wie Vergleichslösung
- Kochsalzlösung in unserem Körper: 9g NaCl/l 0 290 mosmol/l
- Reines Wasser: kaum Osmolarität
- Bei starkem Schwitzen besser: Mineralwasser mit Fruchtsaft
- Mineral allein ca. 1/3 der Körperflüssigkeitsosmolarität

Säure – Basen – Haushalt

- PH-Wert: $\text{pH} = -\log(\text{H}^+)$ negative dekadische Logarithmus der freien Wasserstoffionenkonzentration
- Abfall des pH Wertes = Anstieg der freien Wasserstoffionenkonzentration (Säure)
- Anstieg des pH Wertes = Abfall der freien Wasserstoffionenkonzentration (Basen)
- Körperflüssigkeit: pH Wert: 7,35 – 7,45 entspricht 45- 36 mmol/l
- Funktionen (vom pH Wert abhängig): z.B.: Aktivität von Enzymen, Stoffwechsel, Synthese von DNA, Zellproliferation, O₂ Bindung an das Hämoglobin, Blutgefäßweite, Zustand der Bluteiweißkörper
- **Säuren:** Verbindungen, die in einer Lösung Wasserstoffionen abgeben
- **Basen:** Verbindungen, die Wasserstoffionen binden
- H⁺ Bilanz: H⁺ Ionen aus Nahrung oder Stoffwechsel, Basenverlust (Stuhl), H⁺Eliminierung (Niere)
- Abbau von Säuren: Bicarbonat Ausscheidung (saurer Harn- frei H⁺), Ausscheidung titrierbarer Säuren, Ammoniak – Synthese (alle Nierenzellen können Ammoniak produzieren)
- Bicarbonat Puffergleichung: $[\text{H}^+] + [\text{HCO}_3] = [\text{H}_2\text{CO}_3] = [\text{H}_2\text{O}] + [\text{CO}_2]$

Einteilung von Säuren und Basen im Organismus

- Kohlensäure: H⁺ Konzentration durch Kohlensäure im Plasma ist von der Atemfunktion abhängig
- Metabolisierbare Säuren/Basen: aus Nahrung oder Stoffwechsel (zB.: Laktat), werden durch Stoffwechselfvorgänge kontrolliert (Niere und Ernährung spielen untergeordnete Rolle)
- Nicht-metabolisierbare Säuren/Basen: aus Nahrung oder Stoffwechsel, können nicht abgebaut werden und müssen über Niere eliminiert werden

Regulationsmechanismen

- **Puffersysteme** (binden oder setzen H⁺ frei, rasch aber begrenzte Kapazität): Bicarbonatpuffer (einziges offenes Puffersystem, da über die Lunge Co₂ abgeatmet werden kann), Proteinpuffer, Hämoglobinpuffer, Phosphatpuffer
- **Atmungsfunktion** (Pulmonale Regulation) mehr Abatmung von Co₂ -> mehr Bindung von H⁺ -> weniger freie H⁺
- **Niere (die dabei mit Leber zusammenarbeitet):** Wichtigste Funktion bei der Regulation! pH- Wert des Harns schwankt zwischen 4,5-8,0 Niere scheidet H⁺ in verschiedenen Formen aus vor allem als NH₄⁺ (NH₃ kommt aus der Leber)

Störungen im Säure- Basen- Haushaltes (pH Wert im Plasma)

- Rolle der Ernährung ist umstritten, Mensch kann Säure besser loswerden als Basen

Azidosen: Abnahme des pH- Wertes unter 7,35

- Respiratorische Störung: Hypoventilation [-> Renale (Niere) Kompensation]
- Nicht- respiratorische Störung: Funktionsstörung der Niere, Vorgänge im Stoffwechsel, Metabolisch: Keto- Azidosen (Hungern), Laktat- Azidosen (Muskelübersäuerung), Diabetes Mellitus [-> Pulmonale (Lunge) und renale Kompensation]

Alkalose: Anstieg des pH- Wertes über 7,45

- Respiratorische Störung: Hyperventilation [-> Renale (Niere) Kompensation]
- Nicht- respiratorische Störung: Funktionsstörung der Niere, Vorgänge im Stoffwechsel [-> Pulmonale (Lunge) und renale Kompensation]